



## INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE

---

### PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE

Prezado(a) Enfermeiro (a) \_\_\_\_\_

No dia \_\_\_\_\_ você deu o primeiro atendimento ao paciente \_\_\_\_\_ em quem foi feito o diagnóstico de sepse grave.

Como você sabe, estamos envolvidos na Surviving Sepsis Campaign, procurando otimizar o atendimento prestado ao doente em Sepse na nossa instituição. Por isso, segue abaixo a aderência obtidas com relação a esse paciente nas seis primeiras horas do atendimento.

- sim  não - Colhido lactato sérico
- sim  não - Colhido hemocultura antes do antibiótico
- sim  não - Administrado antibiótico antes de uma hora (ou 3 h se PS)
- sim  não - Se lactato duas vezes o valor normal ou hipotensão, administrado 30 ml/kg de cristalóide em 30 minutos
- sim  não - Se manteve hipotensão imediatamente após item anterior iniciado noradrenalina.
- sim  não - Se manteve hipotensão a despeito de adequada reposição volêmica ou lactato era duas vezes o valor normal, passado acesso venoso central e mensurada/otimizada PVC > 12 a 15 cmH<sub>2</sub>O
- sim  não - Colhido SvO<sub>2</sub> e obtido valor acima de 70%.

### **PARABÉNS!!**

**O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!**

O bom atendimento a nossos pacientes está em suas mãos!!!!

Obrigada,

Protocolo sepse

**PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE**

Prezado(a) Enfermeiro (a) \_\_\_\_\_

No dia \_\_\_\_\_ você deu o primeiro atendimento ao paciente \_\_\_\_\_ em quem foi feito o diagnóstico de sepse grave.

Como você sabe, estamos envolvidos na Surviving Sepsis Campaign, procurando otimizar o atendimento prestado ao doente em Sepse na nossa instituição. Por isso, segue abaixo a aderência obtidas com relação a esse paciente nas seis primeiras horas do atendimento.

**Você e sua equipe são fundamentais para o alcance de bons resultados.**

- ( ) sim ( ) não - Colhido lactato sérico
- ( ) sim ( ) não - Colhido hemocultura antes do antibiótico
- ( ) sim ( ) não - Administrado antibiótico antes de uma hora
- ( ) sim ( ) não - Se lactato duas vezes o valor normal ou hipotensão, administrado 30 ml/kg de cristalóide em 30 minutos
- ( ) sim ( ) não - Se manteve hipotensão imediatamente após ítem anterior iniciado noradrenalina.
- ( ) sim ( ) não - Se manteve hipotensão a despeito de adequada reposição volêmica ou lactato era duas vezes o valor normal, passado acesso venoso central e mensurada/otimizada PVC > 12 a 15 cmH<sub>2</sub>O
- ( ) sim ( ) não - Colhido SvO<sub>2</sub> e obtido valor acima de 70%.

**Precisamos melhorar, você não acha?**

**O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!**

O bom atendimento a nossos pacientes está em suas mãos!!!!

Obrigada,

Protocolo sepse